

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Rebild Kommune



Indhold

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Rebild Kommune	1
1. Indledning	3
2. Lovgrundlag	3
3. Formål	4
4. Indsatsområde og gyldighedsområde.....	4
5. Bekæmpelsespligt	4
6. Tidsfrister for bekæmpelse	4
7. Kontrol, påbud og bekæmpelse på regning	5
8. Ikrafttrædelse	5
Bilag 1: Om kæmpe-bjørneklo	6
1.1 Historie	6
1.2 Karakteristik	6
1.3 Biologi.....	6
1.4 Forvekslingsmuligheder	7
Bilag 2: Bekæmpelsesmetoder	8
2.1 Rodstikning	8
2.2 Slåning	8
2.3 Skærmkapning	8
2.4 Afgræsning.....	9
2.5 Kemisk bekæmpelse – sprøjtning/pensling	9
2.6 Jordbehandling	10
2.7 Afdækning.....	10
2.8 Ikke godkendte bekæmpelsesmetoder	10
2.9 Bekæmpelse af kæmpebjørneklo året rundt.....	10
Efterår - vinter	10
Vækstsæsonen (tidligt forår - sommer).....	11
Sensommer - efterår.....	11
2.10 Bedst egnede bekæmpelsesmetoder	12
Bilag 3: Arbejds miljø og sikkerhed	13

1. Indledning

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo har været i gang i en årrække i Rebild Kommune. I 2011 vedtog Rebild Kommune den første indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Gennem de sidste 15 års indsats, er udbredelsen af kæmpe-bjørneklo faldet betydeligt i indsatsområderne. Rebild Kommune arbejder på at sikre en større biodiversitet i kommunen, og her er et af elementerne at begrænse udbredelsen af invasive arter. Med denne indsatsplan har lodsejere i Rebild Kommune pligt til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på egen grund.

Siden sin indførsel i Danmark har kæmpe-bjørneklo forvildet sig ud i den danske natur, hvor den har vist sig i stand til at forrykke den økologiske balance i naturen. Planten fortrænger hjemmehørende plantearter. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr vil heller ikke leve under bjørneklo. Dette resulterer i en forringelse af naturtilstanden og artsdiversiteten.

Kæmpe-bjørnekloens saft er giftig, og man skal undgå hudkontakt med planten. Plantesaften gør huden ekstremt følsom over for sollys, og hvis huden udsættes for sollys, får man alvorlige forbrændinger. Samtidig kan huden blive ved at være følsom over for sollys i flere år, efter kontakten. Det gør kæmpe-bjørneklo særlig problematisk i rekreative områder, hvor den besværliggør publikumsfærden og ved kontakt forårsager alvorlige sundhedsmæssige risici.

Af disse grunde er kæmpe-bjørneklo i dag på listen over invasive plantearter i både Danmark såvel som Europa.

Hvad er Invasive arter?

Invasive arter er plante- og dyrearter, som mennesker bevidst eller ubevidst har ført til landet, og som har evnen til at fortrænge oprindelige arter og overtage naturen.

Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en invasiv plante. Invasive planter udgør en alvorlig trussel mod den biologiske mangfoldighed og forringer de rekreative og landskabelige værdier. Desuden er kæmpe-bjørneklo uønsket, da den indeholder giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger.

Se mere om kæmpe-bjørneklo på [kommunens hjemmeside under "Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo"](#). I bilagene findes en beskrivelse af kæmpe-bjørneklo (bilag 1), en oversigt over bekæmpelsesmetoder (bilag 2) samt anbefalinger vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed (bilag 3).

2. Lovgrundlag

Grundlaget for indsatsplanen er Bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. På baggrund af bekendtgørelsen kan Rebild Kommune pålægge ejere af arealer, hvor der findes

kæmpe-bjørneklo, at bekæmpe planten i overensstemmelse med endeligt vedtagne og offentliggjorte indsatsplan.

Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af Lov 2017-06-08 nr. 710 af 8. juni 2017 om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og forskellige andre love.

3. Formål

Formålet med indsatsplanen er at udrydde kæmpe-bjørneklo i Rebild Kommune.

Med vedtagelse af denne plan pålægges private såvel som offentlige lodsejere i Rebild Kommune at foretage en effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo på egne arealer.

4. Indsatsområde og gyldighedsområde

Rebild Kommune har inddelt kommunen i indsatsområder, som fremgår af bilag 4.

Indsatsplanen gælder for alle grundejere i Rebild Kommune.

5. Bekæmpelsespligt

Alle ejere af både offentlige og private arealer, hvor der findes kæmpe-bjørneklo, har pligt til effektivt at bekæmpe planten.

Bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo skal resultere i, at den enkelte plante udryddes. I massive bestande samt i bestande, hvor der gennem flere år har været stor frøsætning, skal bekæmpelsen foretages over flere år i træk.

Ejeren har pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan måde, at der på intet tidspunkt sker yderligere spredning af planten, dvs. planten må ikke sætte frø. Hvis planten mod forventning sætter frø, skal frøskærme og frø indsamles i sække og destrueres.

Bekæmpelsespligten gælder alle bestande af kæmpe-bjørneklo.

6. Tidsfrister for bekæmpelse

Ejere af arealer, hvor der findes kæmpe-bjørneklo, har pligt til at bekæmpe planten inden for nedenstående tidsfrister:

1. bekæmpelse, senest 15. april
2. bekæmpelse, senest 01. juni
3. bekæmpelse, senest 15. juli
4. bekæmpelse, senest 15. august

Bekæmpede forekomster af kæmpe-bjørneklo bør tilses hver tredje uge, hvor der bør tages stilling til tidspunkt og metode for næste bekæmpelse.

Det er nødvendigt at tilse forekomster af bekæmpede kæmpe-bjørneklo også efter august, da bekæmpede planter ligeledes sent på sommeren kan danne blomsterstande, som skal fjernes inden frøsætning.

7. Kontrol, påbud og bekæmpelse på regning

For at sikre en effektiv og målrettet indsats med baggrund i indsatsplanens bestemmelser kan Rebild Kommune kontrollere indsatsen på alle arealer i kommunen.

Kommunen har til enhver tid adgang til arealerne med henblik på at gennemføre kontrol eller bekæmpelse.

Konstaterer Rebild Kommune, at bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo ikke foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i denne indsatsplan, kan kommunen i medfør af "Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo", meddele den pågældende lodsejer påbud om at foretage bekæmpelsen inden for en frist på mindst 14 dage.

Af påbuddet vil det fremgå, hvornår kommunen vil foretage kontrol af, om påbuddet er efterkommet.

Påbuddet varsles ikke, idet indsatsplanens tidsfrister anses som et indirekte varsel om påbud.

Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan kommunen beslutte at udføre bekæmpelsen for lodsejerens eller brugerens regning.

Rebild Kommunes afgørelser i henhold til "Bekendtgørelsen om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo" og denne indsatsplan kan påklages til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Klagen sendes til kommunen, som videresender den med bemærkninger til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Klagen skal indgives inden fire uger fra datoen for modtagelsen af afgørelsen. En klage vil ikke have opsættende virkning.

8. Ikrafttrædelse

Indsatsplanen træder i kraft den 01. januar 2027. Indsatsplanen revideres, når Rebild Kommune finder det nødvendigt. Senest 10 år efter indsatsplanens vedtagelse skal Rebild Kommune foretage en vurdering af, om der er behov for en revision af indsatsplanen.

Med ikrafttræden af denne indsatsplan ophæves "Indsatsplan for kæmpe-bjørneklo bekæmpelse i Rebild Kommune 2022-2026".

Bilag 1: Om kæmpe-bjørneklo

1.1 Historie

Bjørneklo er en fælles betegnelse for en gruppe af tæt beslægtede plantearter under slægten *Heracleum*. Den blev bragt til Europa fra Kaukasus i starten af 1800-tallet, først til botaniske haver og siden som prydpilte i private herskabshaver. Med tiden begyndte den dog at sprede sig fra haverne ud i den danske natur, hvor den de seneste årtier har bredt sig hurtigere og hurtigere langs vandløb, grøfter, veje og jernbaner. I Danmark blev situationen yderligere forværret af, at plantens tørre stængler og frøstande blev meget populære til indendørs dekorative formål i 1970'erne og 1980'erne, hvilket har resulteret i yderligere spredning af planten.

1.2 Karakteristik

Kæmpe-bjørneklo er først og fremmest karakteriseret i kraft af sin størrelse og som en af Europas største urter. Planten kan blive op til 4-5 meter høj. Stænglen er hul med spredte stive hår og røde pletter og med tykkelser på op til 10 cm. Bladene er tredelte og kan blive op til 3 meter lange. Da kæmpe-bjørneklo er en skærmpilte, bærer den sine blomster og frø i et antal skærme af varierende størrelse med maksimalt 80 cm i diameter. Blomsterne er hvide, hvidgule eller undertiden lyserøde. En enkelt pilte kan bære op til 80.000-120.000 frø. Når pilten er ung, er bladene runde med takker.



Figur 1: Blomsterskærm (Foto: Marianne Lindhart)



Figur 2: Grundblad (Foto: Marianne Lindhart)

1.3 Biologi

Kæmpe-bjørneklo spirer i det tidlige forår i marts-april. Den blomstrer fra juni og som oftest til august, men det kan ske senere, hvis der er blevet foretaget bekæmpelse, som ikke har slået pilten ihjel. Den gennemfører normalt sin livscyklus på 3-5 år. De første år bruger den på at opbygge en kraftig rod, og først det sidste år blomstre den, hvorefter den dør. Hvis pilten forhindres i at blomstre, kan den overleve betydeligt længere.

Frø fra kæmpe-bjørneklo er udstyret med små vinger, der gør dem i stand til at svæve for vinden adskillige meter væk fra moderplanten. Langt de fleste frø vil dog spire inden for få meter fra moderplanten, men de kan spredes længere, hvis frøet falder i et vandløb eller sætter sig fast på et køretøj. Op imod 90 % af de levedygtige frø vil spire det første år. Frøene er så olieholdige, at de kan henligge i jorden i mange år og stadig være spiredygtige, men enkelte frø kan blive liggende i jorden og bevare spiringsevnen i længere tid.

1.4 Forvekslingsmuligheder

Kæmpe-bjørneklo er meget større end andre skærmplanter, men den bliver alligevel til tider forvekslet med andre planter, som ikke skal bekæmpes. Nogle af disse planter er almindelig bjørneklo, strandkvan, skovangelik, kål-tidsel og pastinak.

Bilag 2: Bekæmpelsesmetoder

2.1 Rodstikning

Rodstikning er en effektiv, men arbejdskrævende metode til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Ved mindre bestande, enkelte planter og grupper på op til 100 planter, foretages rodstikning ved, at roden kappes lige under vækstpunktet, så planten dør. Vækstpunktet ligger typisk 0-2 cm under jordoverfladen, derfor er det tilstrækkeligt at rodstikke planten i 2-3 cms dybde. Der kan med fordel anvendes en bjørneklospade.

Rodstumpen med bladet på kan gro videre, hvis den lægges på fugtig, bar jord. Det anbefales derfor at lægge de opgravede rodstykker, så de ikke har jordkontakt. Husk, at eventuelle blomsterskærme skal fjernes og destrueres, så en eftermodning af frø undgås (afleveres til forbrænding via dagrenovationen eller på genbrugspladsen). Rodstikning er en meget effektiv metode, som muliggør en ret hurtig udryddelse af planten, hvis den gøres systematisk. Afhængigt af områdets tilgængelighed og tætheden af planter kan der rodstikkes 100-300 planter i timen. Rodstikning bør foretages i april-maj med opfølgning i juni.

2.2 Slåning

Manuel slåning af kæmpe-bjørneklo er en mulig metode for mindre bestande, mens mekanisk slåning er en velegnet bekæmpelsesmetode til større bevoksninger. Planterne vil hurtigt efter slåning danne nye skud, hvorfor slåning skal gentages 2-3 gange i løbet af en vækstsæson. Effekten af slåning som bekæmpelsesmetode er, at de gentagende slåninger udsulter planterne, og at blomstring og frøsætning forhindres. Det er vigtigt at forhindre, at nogle af planterne blomstrer og sætter frø mellem slåningerne. Man skal være opmærksom på, at de enkelte planter kan sætte nye skud og blomstre fra korte stængler. Ved gentagende slåninger forhindres det, at der opbygges næring i roden, og planten vil med tiden blive udsultet og dø. Årets første slåning skal foretages inden planterne sætter blomster (april-maj), så frøsætning undgås. Herefter gentages behandlingen med 3 til 4 ugers mellemrum indtil vækstsæsonen er overstået uden blomstring (frem til oktober).

2.3 Skærmapning

Skærmapning kan benyttes på alle arealer. Det er dog en arbejdskrævende og ubehagelig metode, fordi det er svært helt at undgå at komme i kontakt med den giftige saft fra planterne. Skærmapning kan ikke betragtes som egentlig bekæmpelse, men alene som en hindring af frøspredning. Hvis skærmapning foretages på det rette tidspunkt, kan det dog føre til at, at den enkelte plante dør, da plantens oplagrede energi er anvendt til blomstring og dannelse af frø. Ved skærmapning skal skærmene skæres af efter, at planten har blomstret, men inden der er dannet frø, hvilket typisk sker i perioden juni-juli. Hvis skærmene afskæres for tidligt, risikeres det, at plante sætter nye blomster allerede samme år. Det vil dog altid være bedre at kappe skærmene for tidligt end for sent; alternativt bør planten i dette tilfælde rodstikkes. Da frøene kan eftermodne på de afskårne skærme, er det vigtigt, at disse indsamles og destrueres. Det anbefales, at de indsamlede skærme brændes.

De afkappede skærme kan bortskaffes som almindelig dagrenovation eller på genbrugspladserne i Rebild Kommune, hvor de placeres i containeren med "rest efter sortering". **Skærmene må ikke smides i haveaffald.**

2.4 Afgræsning

Afgræsning er en effektiv bekæmpelsesmetode over for større bestande af kæmpe-bjørneklo. Især om foråret er afgræsning effektiv. Når dyrene æder de unge planter, efterhånden som de spirer frem, sætter kæmpe-bjørneklo straks nye skud. Når disse ligeledes straks bliver ædt, ender planten med at blive udsultet og dø. Det er vigtigt, at græsningstrykket er tilstrækkeligt højt (et passende antal dyr), da et for lavt græsningstryk kan betyde en forøgelse af bestanden af kæmpe-bjørneklo.

Får er specielt egnede i forbindelse med bekæmpelsen, da de foretrækker kæmpe-bjørneklo frem for græs, hvilket ikke er tilfældet for kvæg og heste. Hvis får sættes ud i april i så stort antal, at de vil kunne æde de fremspirende kæmpe-bjørneklo, anbefales et højt græsningstryk i foråret (20-30 får pr. ha.), som sænkes i slutningen af juni (5-10 får pr. ha.), når planternes vækst er svækket. I forbindelse med afgræsning er det også vigtigt at bekæmpe de planter, det eventuelt måtte stå uden for indhegningen.

Vær meget opmærksom på, at græssende dyr også kan få skader af kæmpebjørnekloens saft. Hvis dyrene får skader af plantesaften, i form af forbrænding og betændelse, skal de fjernes fra arealet og fra direkte sollys.

2.5 Kemisk bekæmpelse – sprøjtning/pensling

Glyphosat er det aktive stof i bl.a. Roundup, Express og Glyfonova Plus. Hvis man anvender kemisk bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, bør det ske i det tidlige forår, inden de store planter dækker de nyspirede planter, så disse ikke undgår sprøjtegiften. Det er nødvendigt at gentage behandlingen i maj for at bekæmpe de spæde kimplanter (nyspirede planter), der ikke blev ramt ved den første behandling. Den opfølgende behandling med sprøjtemiddel bør senest iværksættes 10-14 dage efter den første behandling. Som afslutning på en kemisk bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, skal der foretages en gennemgang af området i september, hvor eventuelle overlevende planter rodstikkes.

Da glyphosat skader andre planter end kæmpe-bjørneklo, bør behandlingen være så målrettet de enkelte planter som muligt, ved enten afskærmet sprøjtning eller pensling af enkeltplanter. Bredsprøjtning af større arealer bør helt undgås, da der er risiko for at områdets naturlige flora rammes og at giften spredes til det omgivende miljø. Desuden skal den enkelte lodsejer være opmærksom på, at der på en række arealer kan være begrænsninger i forhold til brugen af sprøjtemidler.

Begrænsningerne kan bl.a. gælde arealer der er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, langs vandløb, vandhuller og søer, på brakmarker samt på arealer, hvor der gives tilskud. I forbindelse med eventuel brug af ukrudtsmidler til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo påhviler det den enkelte lodsejer at overholde gældende lovgivning. Rebild Kommune arbejder målrettet på at begrænse brugen af sprøjtemidler og opfordrer derfor til, at disse kun anvendes, hvis andre metoder er meget arbejdskrævende eller ikke praktisk mulig.

2.6 Jordbehandling

Forskellige former for jordbehandling, pløjning, harvning eller fræsning kan være effektiv i områder, hvor det er muligt at komme til med maskiner. Det giver mulighed for at bekæmpe store arealer på kort tid. Man skal dog være opmærksom på, at fræsning kan fremme spredningen af andre uønskede planter som fx Rød Hestehov.

Behandlingen skal foretages 3-4 gange fra april til september, da det må forventes, at der fremspirer nye planter efter behandlingen, og enkelte gamle planter skyder igen. Metoden kan eventuelt kombineres med efterfølgende slåning.

Der må ikke jordbehandles i naturområder (§ 3 i Naturbeskyttelsesloven), på gamle græsningsarealer, brakarealer eller i 2 m bræmmer langs vandløb og søer.

2.7 Afdækning

Velafrænsede bestande i åbent land kan med fordel afdækkes, enten med presenning, ukrudtsdug eller med UV-uigennemtrængeligt plast. Når kæmpe-bjørneklo dækkes til, visner den ned, og afdækning kan i bedste fald udrydde 98-99% af planterne. Metoden er yderst anbefalelsesværdig, da den er meget effektiv, og fordi kontakten med planten er begrænset. Året efter ses meget lille overlevelse og næsten ingen fremspiring fra frøbanken.

Arealet, der afdækkes, bliver helt barjordnet, men hvis afdækning fjernes i løbet af august måned, vil mange danske planter overleve eller indfinde sig, og ofte vil den omgivende vegetation indfinde sig igen i løbet af efteråret, så erosionsrisikoen mindskes.

Afdækning er forbundet med en meget stor overvågningsindsats, idet planterne kan bryde igennem, eller afdækningen kan blæse af. Hvis afdækningen ligger stabilt i en periode med høj sol, kan man være heldig, at alle planterne under afdækningen er døde i løbet tre til fire måneder.

2.8 Ikke godkendte bekæmpelsesmetoder

Gennem tiden er der beskrevet en række alternative bekæmpelsesmetoder af kæmpe-bjørneklo. Her kan bl.a. nævnes salt, salmiakspiritus, fyringsolie og andre kemikalier. Disse metoder er ikke godkendte, da de kan forurene jord- og vandmiljøet.

2.9 Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo året rundt

Efterår - vinter

- ☐ Få overblik over antal bestande og bestandsstørrelser
- ☐ Undersøg hvilke metoder der er velegnede
- ☐ Planlæg aktuelle bekæmpelsesmetoder
- ☐ Udarbejd bekæmpelsesplan
- ☐ Ryd krat, brombær mm, som vil genere en kommende bekæmpelse
- ☐ Søg nødvendige tilladelser
- ☐ Lav græsningsaftaler
- ☐ Etabler folde, læskure, vand m.v. på arealer, der skal afgræsses

- ☐ Anskaf redskaber og beskyttelsesudstyr

Vækstsæsonen (tidligt forår - sommer)

- ☐ Etabler græsning med dagligt tilsyn og pasning af dyrene
- ☐ Afdæk planterne
- ☐ Husk at bekæmpe planter uden for græsningsfoldene!
- ☐ Rodstik planterne mindst 3 gange
- ☐ Udfør slåning mindst 4 gange
- ☐ Skærmbak omhyggeligt
- ☐ Udfør andre bekæmpelsesmetoder efter behov
- ☐ Før tilsyn med bestandene hver tredje uge
- ☐ Juster bekæmpelsesplaner og -metoder

Sensommer - efterår

- ☐ Gør status over årets bekæmpelse og revurder metoderne
- ☐ Planlæg næste års indsats
- ☐ Indberet gerne årets indsats og resultat til din kommune
- ☐ Afskær alle sene skærme før frøspredning
- ☐ Afslut græsning

2.10 Bedst egnede bekæmpelsesmetoder

Den bekæmpelsesmetode, der er bedst egnet, er meget afhængig af bestandsstørrelse og tæthed af kæmpe-bjørneklo samt af terræn og tilgængelighed. Nedenfor ses en skematisk gennemgang af de anbefalede bekæmpelsesmetoder og de typer bestande, de er bedst egnede til. I nogle tilfælde kan forskellige metoder med fordel kombineres.

Bestandens størrelse	Lille 1-20 stk.	Mindre 10-100 stk.	Stor > 100 stk.
Rodstikning	Bedste metode.	Effektiv, men noget tidskrævende.	Effektiv men meget tidskrævende.
Slåning	I orden, men rodstikning/opgravning giver hurtigere resultater.	Slåning kan overvejes forud for græsning.	Slåning kan overvejes forud for græsning.
Græsning	Anbefales ikke medmindre der er hegnet i forvejen.	Hvor fremkommeligheden er meget ringe og hvor forholdene ellers ellers taler for det, bør græsning bestemt overvejes.	Der bør etableres græsning. Især hvis arealet er svært tilgængeligt med maskiner. *
Skærmbekapning	Bør ske hvis man ikke når at fjerne planterne inden frømodning.	Bør ske hvis man ikke når at fjerne planterne inden frømodning.	Bør ske hvis man ikke når at fjerne planterne inden frømodning.
Afdækning	Anbefales ikke	Kan anvendes i bestande på åben bund. Kræver de rigtige materialer og en del tilsyn.	Kan anvendes i bestande på åben bund. Kræver de rigtige materialer og en del tilsyn.
Jordbehandling	Anbefales ikke	På landbrugsjord, kan kræve dispensation	På landbrugsjord, kan kræve dispensation
Sprøjtning med glyphosat	Anbefales ikke	Vigtigt at starte i det tidlige forår, og gentage 10-14 dage efter 1. behandling. Senere brug af glyphosat har ingen eller modsat virkning på planten. HUSK afstandskrav samt natur- og miljøhensyn. Kan kræve dispensation	Vigtigt at starte i det tidlige forår, og gentage 10-14 dage efter 1. behandling. Senere brug af glyphosat har ingen eller modsat virkning på planten. HUSK afstandskrav samt natur- og miljøhensyn. Kan kræve dispensation.

* Ved etablering af hegn er det meget vigtigt at bræmmer så vidt muligt undgås – der bør hegnes med omtanke.

Bilag 3: Arbejdsmiljø og sikkerhed

Kæmpe-bjørneklo i god vækst indeholder store mængder saft. Saften indeholder en række kemiske stoffer kaldet furanocoumariner, som ved hudkontakt og sollys udløser en fotokemisk reaktion i huden, der medfører forbrænding og overfølsomhedsreaktioner. Da den umiddelbare kontakt med plantesaften er smertefri, er der ikke et "alarmsystem" der advarer om kontakten. Overfølsomhedsreaktionen starter allerede ca. 15 minutter efter kontakten med plantesaften og er størst mellem ½ og 2 timer efter kontakten. Uanset hvilken metode man anvender til bekæmpelse, skal man være opmærksom på, at plantens saft giver smertefulde vabler og udslæt. Alle, der foretager bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo skal være opmærksomme på dette og tage passende forholdsregler for at undgå kontakt med plantens saft.

Undgå at få saften på huden og i øjnene. Brug regntøj, gummistøvler, lange handsker, beskyttelsesbriller eller visir samt andre relevante værnemidler. Brug i det hele taget syntetiske og vandafvisende materialer – også til handsker – da bomulds- og lærredstøj opsuger saften. Pas på ikke at berøre saftforurenede beklædningsgenstande.

Ved brug af motorredskaber som fx buskrydder er det vigtigt at være opmærksom på ikke at indånde saftpartikler og i øvrigt at undgå at få dem på huden.

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo kan med fordel foretages, når der er overskyet eller når det regner.

Får du saft på huden, skal det skylles af med rigelige mængder vand, og området skal holdes beskyttet mod sollys i **mindst en uge**. Ved omfattende kontakt med plantesaften, bør du kontakte din læge.